CAHIER DE VACANCES :**Préparer ma rentrée en 1^{ère} : Enseignement de spécialité Mathématiques****Partie I : Recueil de méthodes et outils portant sur l'ensemble du programme de seconde.**

Dans ce cahier, je vous propose des exercices à traiter avant la rentrée pour envisager plus sereinement l'année de première, enseignement de spécialité en mathématiques. Ce travail sera d'autant plus efficace si vous le faites avec sérieux et de manière autonome.

Quelques conseils d'organisation :

- Echelonner votre travail sur une ou deux semaines (4 à 6 exercices par jour).
- S'assurer que l'on maîtrise le cours avant de faire les exercices en s'interrogeant au brouillon sur ce que l'on sait concernant le sujet abordé.
- Faire attention au soin et à la rédaction.
- Si vous ne réussissez pas à effectuer un exercice, n'abandonnez pas, allez rouvrir votre cours de seconde pour y retrouver un exercice du même type.
- Les exercices signalés par des étoiles * demandent un peu plus de recherche.

Bon courage aux futurs spécialistes et bonnes vacances !**1. La notion d'ensemble :** **Outils**

Définition 1 : Les ensembles A et B sont deux sous ensembles de l'ensemble E si, et seulement si, tous les éléments de A et de B sont dans l'ensemble E .

On note : $A \subset E$ et $B \subset E$ et on lit « A est inclus dans E ».

Remarque : La notation est différente lorsqu'on s'intéresse à un élément x de cet ensemble : on emploie le symbole $\in$ qui se lit appartient.

Si $x \in A$ alors $x \in E$.

Définition 2 : L'ensemble noté $\bar{A}$ est l'ensemble de tous les éléments de l'ensemble E qui n'appartiennent pas à l'ensemble A , on l'appelle le **complémentaire de A dans l'ensemble E** et on lit « A barre ».

Soit x un élément de E , si $x \notin A$ alors $x \in \bar{A}$.

Définition 3 : $A \cup B$ est l'ensemble des éléments de E qui appartiennent à A **ou** à B ou au deux à la fois. On l'appelle le **réunion des deux ensembles A et B** et on lit « A union B ».

$A \cap B$ est l'ensemble des éléments de E qui appartiennent à la fois à A **et** à B . On l'appelle le **intersection des deux ensembles A et B** et on lit « A inter B ».

Soit x un élément de E , si $x \in A$ et $x \in B$ alors $x \in A \cap B$.

si $x \in A$ et $x \notin B$ alors $x \in A \cup B$.

si $x \in A$ et $x \in B$ alors $x \in A \cup B$.

Remarque : Si $A \cap B = \emptyset$, alors on dit que les deux ensembles A et B sont **disjoints**.

Exercice n° 1

Le tableau ci-dessous donne le nombre de chômeurs (en milliers) selon le sexe et l'âge en 2012

	Femmes (F)	Hommes (H)	Ensemble
15 ans ou plus (C)	1 361	1 451	2 812
15 - 24 ans (C_1)	297	361	658
25 - 49 ans (C_2)	812	816	1 628
50 - 64 ans (C_3)	250	272	522
65 ans ou plus (C_4)	2	2	4

source : INSEE, enquête Emploi 2012

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant).

- Combien d'éléments possède l'ensemble F ?
- Concrètement, dans cet exemple, l'ensemble C de tous les éléments étudiés est l'ensemble de tous les ...
Combien d'éléments possède-t-il ?
- $H \cap C_2$ est l'ensemble des Combien d'éléments cet ensemble possède-t-il ?
- $F \cup C_3$ est l'ensemble des Combien d'éléments cet ensemble possède-t-il ?
- $\overline{F}$ est l'ensemble des Combien d'éléments cet ensemble possède-t-il ?
- $\overline{C_1}$ est l'ensemble des Combien d'éléments cet ensemble possède-t-il ?

Exercice n° 2

Recopier et compléter les pointillés :

- $3 \cdots \mathbb{N}$; $-3 \cdots \mathbb{N}$; $\mathbb{N} \cdots \mathbb{R}$; $\sqrt{5} \cdots \mathbb{Q}$.
- Soit x un nombre compris entre 1 et 2, mais différent de 2, alors $x \cdots [1; 2[$ et $[1; 2[\cdots \mathbb{R}$
- $[1; 13[\cap]0; 2[= \cdots$
- Les deux intervalles $[1; 3]$ et $[4; +\infty[$ sont
- L'ensemble de tous les nombres réels qui ne sont pas strictement supérieurs à 4 est l'intervalle ...
- Soit x un nombre réel. Si $x \notin [1; 3[$ alors $x \in \cdots$.
- Le complémentaire de l'ensemble $[1; 3[$ dans $\mathbb{R}$ est donc
- Le complémentaire de l'ensemble des réels x tels que $x > 1$ est l'intervalle

2. Calcul numérique: **Prérequis**

- ⇒ Règles de calculs sur les fractions et les puissances.
- ⇒ Racine carrée d'un nombre réel positif et règles de calculs.

Outils**Somme**

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

⇒ les fractions doivent avoir le même dénominateur.

Produit

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

⇒ On multiplie numérateurs et dénominateurs entre eux.

Quotient

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

⇒ diviser c'est multiplier par l'inverse.

Exercice n° 3

Sans utiliser la calculatrice, écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$ le plus petit possible.

1. $D = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$;

2. $E = \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + 3 \left(\frac{4}{5} - \frac{5}{6} \right)$;

3. $F = \frac{\frac{3}{2} - \frac{7}{5}}{\frac{2}{5} \times \frac{4}{3} + 1}$.

Exercice n° 4

Calculer sans calculatrice.

1. $A = \frac{3^{27} - 3^{29}}{3^{28}}$

3. $C = \frac{3^{-6} \times 5^5}{(5^2)^3 \times 3^{-5}}$;

5. $E = \frac{3^{1505} + 3^{1505} + 3^{1505}}{3^{1506}}$.

2. $B = \frac{(2^5) \times 4^{-5}}{8}$;

4. $D = \frac{8^2 \times 9^{-5}}{3^{-11} \times 2^8}$;

Exemples - Opérations avec des radicaux

$G = \sqrt{49}$

$H = \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{56}}$

$I = \sqrt{48} + \sqrt{12}$

$G = \sqrt{7^2}$

$I = \sqrt{3 \times 4^2} + \sqrt{3 \times 2^2}$

$G = 7$

$H = \sqrt{\frac{14}{56}}$

$I = 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$

$H = \sqrt{\frac{1}{3}}$

$I = 6\sqrt{3}$

$H = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Exercice n° 5

Sans utiliser la calculatrice, écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$ le plus petit possible.

1. $J = \sqrt{48}$;

3. $L = 5\sqrt{27} - 3\sqrt{48}$;

4. $M = \frac{\sqrt{81}}{\sqrt{242}} \times \frac{\sqrt{98}}{\sqrt{25}}$.

2. $K = \sqrt{36 + 64}$;

Utilisation de l'expression conjuguée

L'expression conjuguée de $3 + \sqrt{5}$ est $3 - \sqrt{5}$.

On utilise l'expression conjuguée pour écrire un quotient sans radical au dénominateur.

$N = \frac{2}{3 + \sqrt{5}}$

$N = \frac{2}{3 + \sqrt{5}} \times \frac{3 - \sqrt{5}}{3 - \sqrt{5}}$

$N = \frac{2 \times (3 - \sqrt{5})}{14}$

$N = \frac{2 \times (3 - \sqrt{5})}{(3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5})}$

$N = \frac{2 \times (3 - \sqrt{5})}{2 \times 7}$

$N = \frac{2 \times (3 - \sqrt{5})}{3^2 + \sqrt{5}^2}$

$N = \frac{3 - \sqrt{5}}{7}$

Exercice n° 6

Ecrire sans radical au dénominateur et simplifier les expressions suivantes.

1. $A = \frac{3}{\sqrt{5} + 1}$;

3. $C = \frac{1 + \sqrt{5}}{3 - \sqrt{5}}$;

4. $D = \frac{6 - \sqrt{2}}{4 - \sqrt{2}}$.

2. $B = \frac{-2}{\sqrt{7} - 2}$;

Exercice n° 7

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = 2x - 3 + \frac{1}{x+1}$.

1. Montrer que, pour tout $x \neq -1$, on a $f(x) = \frac{2x^2 - x - 2}{x+1}$.

2. Effectuer les calculs d'image suivants.

On donnera le résultat sous la forme la plus simple possible.

a. $f\left(\frac{2}{3}\right)$;

b. $f(\sqrt{5})$;

c. $f(\sqrt{3}-1)$.

Exercice n° 8

* Les deux questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Le nombre $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ est appelé le **nombre d'or**. Montrer que $\phi^2 - \phi - 1 = 0$.

2. Montrer que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $\frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.

Exercice n° 9

* Démontrer que pour tout entier naturel n , on a $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.

3. Calcul littéral: **Prérequis**

- ⇒ Maîtriser les identités remarquables et les priorités de développements.
- ⇒ Repérer ou mettre en évidence un facteur commun pour factoriser.
- ⇒ Mettre en évidence une identité remarquable pour factoriser.
- ⇒ Réduire des fractions au même dénominateur.

Outils

Identités remarquables

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$;
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$;
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Exercice n° 10

Exemple guidé - Développer des expressions

Recopie et complète les pointillés.

$$A = 2(3x - 1)^2 - (5x + 3)(2 - 3x)$$

$$A = 2(\dots x^2 - \dots + 1) - (10x - \dots + \dots - \dots)$$

$$A = 18x^2 - \dots + 1 - 10x + \dots - \dots + \dots \quad \text{donc } A = \dots$$

En utilisant la même méthode, développe les expressions suivantes :

$$B = (2x - 9)(3 - 2x) + 5(2x + 1)^2 \quad C = 4(x - 6)^2 - 3(5x + 3)(5x - 3)$$

Exercice n° 11**Exemple guidé - Factoriser des expressions**

Recopie et complète les pointillés.

$$A = 6x + 3 + 4(2x + 1)^2$$

$$A = \dots(2x + 1) + 4(2x + 1)(\dots)$$

$$A = (2x + 1)(\dots + 4(\dots))$$

$$A = (2x + 1)(\dots + 8x + \dots) \quad \text{donc } A = (\dots)(\dots)$$

En utilisant la même méthode, factorise les expressions suivantes :

$$B = 2(5x - 1)^2 + 10x - 2 \quad C = (x^2 - 4) - (x + 2)^2$$

Exercice n° 12**Exemple guidé - Factoriser des expressions**

Recopie et complète les pointillés.

$$A = 36x^2 - (5x + 1)^2$$

$$A = (\dots)^2 - (5x + 1)^2$$

$$A = ((6x) + (\dots))((6x) - (\dots))$$

$$A = (6x \dots)(6x \dots) \quad \text{donc } A = (\dots)(\dots)$$

En utilisant la même méthode, factorise les expressions suivantes :

$$B = (4x - 3)^2 - 25x^2 \quad C = 49 - (5x + 2)^2$$

Exercice n° 13**Exemple guidé - Ecrire sous forme d'une seule fraction.**

Recopie et complète les pointillés.

$$A = 4 + \frac{3}{x + 2}$$

$$A = \frac{4 \times (\dots + \dots)}{x + 2} + \frac{3}{x + 2}$$

$$A = \frac{\dots + \dots}{x + 2} + \frac{3}{x + 2} \quad \text{donc } A = \frac{\dots + \dots}{x + 2}$$

En utilisant la même méthode, écris sous la forme d'une seule fraction les expressions suivantes :

$$B = \frac{2x}{3x - 1} - 5 \quad C = \frac{4}{2x + 6} - \frac{3}{x - 5}$$

4. Les Fonctions :

Exercice n° 14

Soit x la largeur d'un rectangle. Elle est égale à sa longueur moins 7.

1. Exprime le périmètre de ce rectangle en fonction de x .
2. Exprime l'aire de ce rectangle en fonction de x .
3. Calcule son périmètre et son aire si $x = 13\text{cm}$.

Exercice n° 15

Une piscine propose deux formules pour le paiement des entrées.

- Première formule : abonnement annuel de 20€, plus 2 € par entrée ;
 - Deuxième formule : 5€ par entrée.
1. Donne dans chacun des cas le prix payé en fonction de x .
 2. Calcule le prix payé suivant les deux formules pour 4 entrées et pour 25 entrées. Dans chaque cas, quelle est la formule la plus avantageuse ?

Prérequis

- ⇒ Notions de fonction, d'image, d'antécédent.
- ⇒ Fonctions affines.
- ⇒ Résolution d'équations.

Exercice n° 17

On considère la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 3$. Sa représentation graphique est donnée ci-contre.

1. Déterminer graphiquement l'image de 2 par f .
2. Retrouver ce résultat par le calcul.
3. Déterminer graphiquement l'antécédent par f de $-0,5$.
4. Retrouver ce résultat par le calcul.

Exercice n° 18

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x - 4$.
Sa représentation graphique est donnée ci-contre.

1. a. Déterminer graphiquement l'image par f de 5.
b. Retrouver ce résultat par le calcul.
2. Déterminer graphiquement les antécédents de 0 par f .
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -4$.
4. Dresser le tableau de variation de la fonction f .
5. Dresser le tableau de signes de la fonction f .

Exercice n° 19

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$.
Sa représentation graphique est donnée ci-contre.

1. a. Déterminer graphiquement l'image par f de $-\frac{3}{2}$.
b. Retrouver ce résultat par le calcul.
2. a. Développer $(x - 3)(x + 2)$.
b. En déduire l'expression factorisée de f .
c. Calculer les antécédents de 0 par f .
d. Retrouver graphiquement les résultats.
3. Dresser le tableau de variation de la fonction f par lecture graphique.
4. En utilisant la factorisation de f , dresser le tableau de signes de f .
5. a. Déterminer graphiquement les antécédents de -6 par f .
b. Factoriser $x^3 - x^2$ et $-6x + 6$.
c. * Résoudre algébriquement l'équation $f(x) = -6$.

Exercice n° 21

On dispose d'un carré de métal de 10 cm de côté.

Pour fabriquer une boîte sans couvercle, on enlève à chaque coin un carré de côté x cm et on relève les bords pour obtenir un pavé droit.

1. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles on peut fabriquer une boîte.
2. Exprimer le volume $\mathcal{V}(x)$ de la boîte en fonction de x .
3. Utiliser la calculatrice pour déterminer le volume maximal et la valeur de x correspondante (on arrondira au dixième).

Exercice n° 22

Une entreprise fabrique des cartes à puces électronique à l'aide d'une machine.

La fonction f représente le coût d'utilisation de la machine en fonction de la quantité x de cartes produites, lorsque x est exprimé en centaines de cartes et $f(x)$ en centaines d'euros.

La courbe $\mathcal{C}$ représentative de la fonction f est donnée ci-dessous.

1. Déterminer graphiquement le nombre de cartes à produire pour avoir un coût minimal d'utilisation de la machine. (Valeur approchée à la dizaine de cartes près)
2. Chaque carte fabriquée est vendue 1,50 €. Exprimer, en fonction de x , la recette $R(x)$ perçue pour la vente de x centaines de cartes.
3. Représenter graphiquement la fonction R ainsi définie.
4. Exprimer en fonction de x , le bénéfice $B(x)$ réalisé pour la fabrication et la vente de x centaines de cartes.
5. On dira que l'entreprise réalise un bénéfice si $B(x) > 0$. En utilisant le graphique, indiquer la quantité minimale qui doit figurer sur le carnet de commandes de l'entreprise pour que celle-ci puisse réaliser un bénéfice. (Valeur approchée à la dizaine près)

5. Equations:

Prérequis

- ⇒ Savoir développer et factoriser une expression.
- ⇒ Connaître et savoir utiliser les identités remarquables.
- ⇒ Résolution d'une équation du premier degré et d'une équation produit nul.

Outils

A la fin de votre année de seconde, vous savez résoudre trois types d'équation.

- Equation linéaire, (elle ne comporte aucune puissance de x , ni de fraction comportant des termes en x au dénominateur).
On se ramène à l'équation $ax = b$ en développant, si besoin, chaque membre de l'équation et en isolant les différents termes en x d'un même côté de l'égalité.
- Equation produit nul.
- Equation comportant des puissances de x (qu'il n'est pas possible « d'éliminer » par un simple développement).
Il faut tenter de factoriser l'expression afin de se ramener à la résolution d'une équation produit nul.
- Equation comportant des fractions rationnelles (C'est à dire des fractions avec des x au dénominateur).
Il conviendra tout d'abord de déterminer l'ensemble des valeurs interdites (celles qui donnent un ou des dénominateurs égaux à 0)
Puis, il faudra transformer l'écriture de manière à se ramener à l'égalité de deux fractions. On pourra alors utiliser l'égalité des produits en croix ou la mise au même dénominateur afin de se ramener à l'un des deux cas précédents.

Exemple - Résolution d'une équation linéaire

$$3(2x - 3) + 3x = 5x - 2(5 - 9x)$$

Développer et se ramener à :

$$-14x = -1$$

Montrer alors que $S = \left\{ \frac{1}{14} \right\}$

Exemple - Résolution d'une équation produit

$$81x^2 - 16 = (9x - 4)(2x - 3)$$

Reconnaître une identité remarquable, factoriser et se ramener à :

$$-(9x - 4)(7x + 7) = 0$$

Montrer alors que $S = \left\{ \frac{4}{9}; -1 \right\}$

Exemple - Résolution d'une équation rationnelle

$$x + 1 = \frac{9}{x + 1}$$

Déterminer les éventuelles valeurs interdites

En utilisant l'égalité des produits en croix, se ramener à :

$$(x + 1)^2 = 9$$

Montrer alors que $S = \{2; -4\}$

Exercice n° 23

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $2x + 3 = -3x + 7;$

4. $(-x - 4)(-x + 7) = 0;$

7. $\frac{5 - 8x}{x - 2} = 3;$

2. $-4x + 1 = 9;$

5. $9(-3x - 1)(6x - 36) = 0;$

8. $\frac{-3x - 1}{8 - 5x} = 0.$

3. $-x = x + 16;$

6. $-x(x + 16)(2 - 5x) = 0;$

Exercice n° 24

* Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $(5x - 1)(x - 9) - (x - 9)(2x - 1) = 0;$

4. $\frac{3x - 1}{x - 5} = \frac{3x - 4}{x};$

2. $(x - 1)(2x - 7) = 4x^2 - 28x + 49;$

5. $\frac{x^2 - 3x}{(x - 3)^2} = 4.$

3. $x + 1 = \frac{9}{x + 1};$

6. Inéquations et tableaux de signes : Prérequis

- ⇒ Savoir développer et factoriser une expression.
- ⇒ Règle des signes pour un produit ou un quotient.
- ⇒ Étudier le signe d'une fonction affine.

Outils

Comme pour les équations, on traite différemment les expressions linéaires, les expressions factorisées (ou factorisables) et les expressions rationnelles.

Inéquation du premier degré

Exemple - Résolution d'une inéquation du premier degré

$$2x - 3 \leq 1$$

$$2x \leq 4$$

$$x \leq 2 \quad \text{donc } S =]-\infty; 2]$$

$$-5x - 4 \leq 6$$

$$-5x \leq 10$$

$$x \geq -2 \quad \text{donc } S = [-2; +\infty[$$

Exercice n° 25

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $6x + 7 > 4x + 8$;

2. $x + 1 \geq 9x + 25$;

3. $-7 \leq 4x + 9$.

Signe d'un produit**Exemple guidé - Etude du signe d'un produit**

On veut étudier le signe dans $\mathbb{R}$ du produit $P(x) = (-2x - 6)(x - 5)$.

On cherche les valeurs qui annulent chaque facteur. On parle de racine d'une expression.

Racine de $-2x - 6$:

$$-2x - 6 = 0 \iff \dots$$

Racine de $x - 5$:

$$x - 5 = 0 \iff \dots$$

On étudie le signe de chaque facteur :

... ..

On complète le tableau avec les signes qui conviennent.

x	$-\infty$	...	...	$+\infty$
signe de $-2x - 6$		0		
signe de $x - 5$			0	
signe de $P(x)$		0	0	

On peut alors en déduire les solutions des inéquations $P(x) > 0$ ou $P(x) \leq 0$ ou tout autre inéquation.

Exercice n° 26

1. Etudier le signe de $P(x) = (-3x + 12)(7 - 2x)$.

2. En déduire les solutions de l'inéquation $P(x) \geq 0$.

Exercice n° 27

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $(x - 8)(-1 - 10x) \leq 0$;

2. $(3x + 2)^2 - (3x + 2)(5x + 1) \leq 0$.

Exercice n° 28

* On considère deux nombres réels x et y dont la somme est 20.

On souhaite que leur produit P soit supérieur ou égal à 91.

1. Exprimer y en fonction de x .

2. Démontrer que résoudre l'inéquation $P \geq 91$ revient à résoudre l'inéquation $(7 - x)(13 - x) \geq 0$.

3. Conclure.

Exercice n° 29

1. Etudier le signe de $Q(x) = \frac{-2x + 3}{x + 4}$.
2. En déduire les solutions de l'inéquation $Q(x) \leq 0$.

Exercice n° 30

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $\frac{3}{2x - 7} \leq 0$;
2. $5 + \frac{2}{x + 3} \leq 0$.

Exercice n° 31

* * Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $\frac{x^2 - 16}{9 - 4x^2} \geq 0$;
2. $\frac{2x + 3}{x + 1} \leq \frac{x + 1}{2x + 3}$.

7. Géométrie : **Prérequis**

- ⇒ Connaître et savoir utiliser la formule de la distance entre deux points.
- ⇒ Connaître et savoir utiliser la formule donnant les coordonnées du milieu d'un segment.
- ⇒ Connaître et savoir utiliser les définitions et les propriétés des figures usuelles.
- ⇒ Somme de deux vecteurs, produit d'un vecteur par un réel, relation de Chasles.
- ⇒ Coordonnées d'un vecteur dans un repère.
- ⇒ Déterminant de deux vecteurs.
- ⇒ Caractérisation de deux vecteurs colinéaires.

Géométrie vectorielle **Outils**

- La translation qui transforme A en B est la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme.
- Deux vecteurs égaux ont même direction, même sens et même norme.
- Relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si ils ont même direction.
- Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si, il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.

Exercice n° 32

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.
 Pour chaque affirmation, trouver la (ou les) réponse(s) correcte(s).

1. $REVI$ est un parallélogramme, alors :

- a. $\overrightarrow{RE} = \overrightarrow{VI}$ b. $\overrightarrow{ER} = \overrightarrow{VI}$ c. $\overrightarrow{RV} = \overrightarrow{EI}$ d. $\overrightarrow{IR} = \overrightarrow{VE}$

2. $SION$ est un parallélogramme, alors :

- a. $\overrightarrow{SO} = \overrightarrow{SI} + \overrightarrow{IO}$ b. $\overrightarrow{SO} = \overrightarrow{OI} + \overrightarrow{NI}$ c. $\overrightarrow{SN} = \overrightarrow{SI} + \overrightarrow{ON}$ d. $\overrightarrow{IN} = \overrightarrow{IS} + \overrightarrow{IO}$

3. Dans la figure ci-contre, le vecteur $\vec{u}$ est égal à :

- a. $\overrightarrow{CA}$ b. $\overrightarrow{DA}$ c. $\overrightarrow{BE}$ d. $\overrightarrow{FE}$

4. Dans la figure ci-contre, le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ est égal à :

- a. $\overrightarrow{EA}$ b. $\overrightarrow{CB}$ c. $\overrightarrow{FE}$ d. $\overrightarrow{DB}$

5. Dans la figure ci-contre, le vecteur $\vec{u} - \vec{v}$ est égal à :

- a. $\overrightarrow{EA}$ b. $\overrightarrow{CB}$ c. $\overrightarrow{FE}$ d. $\overrightarrow{DB}$

6. Dans la figure ci-contre, le vecteur $\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}$ est égal à :

- a. $\overrightarrow{EA}$ b. $\overrightarrow{CB}$ c. $\overrightarrow{FE}$ d. $\overrightarrow{DB}$

7. dans la figure ci-dessous, les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont

- a. colinéaires b. égaux c. opposés d. non colinéaires

8. Dans la figure ci-dessus, les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{KB}$ sont

- a. colinéaires b. égaux c. opposés d. non colinéaires

9. Dans la figure ci-dessus, les vecteurs $\overrightarrow{IK}$ et $\overrightarrow{JA}$ sont

- a. colinéaires b. égaux c. opposés d. non colinéaires

10. Dans la figure ci-dessus, quelles égalités sont vraies ?

- a. $\overrightarrow{JI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ b. $\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{CK} + \overrightarrow{IK}$ c. $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{BJ} + \overrightarrow{BK}$ d. $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{BJ}$

Exercice n° 33

On considère le triangle ABC , construire les points D , E et F tels que :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{BD} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{FB} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$$

Géométrie analytique **Outils**

Pour deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$,

• Les coordonnées du milieu $I(x_I; y_I)$ sont
$$\begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_I = \frac{y_A + y_B}{2} \end{cases} ;$$

•
$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

• Si le repère est orthonormé, la distance $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Pour deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$,

• Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées.

• Le déterminant des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le réel $det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y$

• Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.

Exercice n° 38

* Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Tracer les droites d_1 et d_2 d'équation respectives $y = -0,5x - 2$ et $y = 4x - 20$.
2. a. Tracer la droite d_3 passant par le point $A(-2; 5)$ et de coefficient directeur $m = -\frac{3}{2}$.
b. Déterminer l'équation réduite de d_3 .
3. a. Justifier que les droites d_1 et d_2 sont sécantes.
b. Calculer les coordonnées du point M d'intersection des droites d_1 et d_2 .
c. Le point M appartient-il à d_3 ?
Si c'est le cas, on dit que les droites d_1 , d_2 et d_3 sont concourantes en M .

Exercice n° 39

On se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Représenter d la droite d'équation $2x - 3y + 7 = 0$.
2. Donner l'ordonnée du point A de la droite d d'abscisse $-\frac{1}{2}$.
3. Donner l'ordonnée du point B de la droite d d'ordonnée 1.

Exercice n° 40

Dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(2; 4)$; $B(-1; 1)$ et $C(5; 10)$

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite Δ passant pas C et parallèle à (AB) .

Exercice n° 41

D'après un exercice du manuel *Le livre scolaire* éditions 2019

* Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(2; -1)$, $B(1; 2)$ et $M(x; y)$.

1. Exprimer MO^2 et MA^2 en fonction de x et y .
2. On rappelle que la médiatrice Δ de $[OA]$ est l'ensemble des points M tels que $MO = MA$.
Comme les distances sont positives, cela revient à $MO^2 = MA^2$.
En déduire une relation entre x et y , cette égalité est une équation cartésienne de Δ .
3. De même déterminer une équation cartésienne de la médiatrice d de $[OB]$.
4. Calculer les coordonnées de C , point d'intersection des ces droites.
Que peut-on dire de C dans le triangle OAB ?
5. a. Calculer les coordonnées de K , milieu $[AB]$.
b. En déduire la nature du triangle OAB .

8. Probabilités : **Prérequis**

- ⇒ Notion d'expérience aléatoire et de modélisation (notamment à l'aide d'arbres).
- ⇒ Calculs de probabilités.
- ⇒ Langage des événements.
- ⇒ Réunion et intersection d'événements.
- ⇒ Événement contraire.

Exercice n° 42

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Pour chaque question, seule une réponse parmi celles proposées est exacte.

1. À Noël, Robin s'est fait offrir la trilogie des films « Batman » (trois films, sortis en 2005, 2008 et 2012). Il insère au hasard l'un des DVD dans son lecteur. Quel est la probabilité que ce soit le film le plus récent ?

a. $\frac{1}{6}$

b. $\frac{1}{3}$

c. $\frac{1}{2}$

d. $\frac{2}{3}$

2. Robin place les trois DVD côte à côte, mais au hasard, sur une étagère. Quelle est la probabilité que les films soient rangés dans l'ordre chronologique de gauche à droite ?

a. $\frac{1}{6}$

b. $\frac{1}{3}$

c. $\frac{1}{2}$

d. $\frac{2}{3}$

3. On tire au hasard deux cartes dans un jeu de 32. On note A l'événement : « Obtenir au moins un roi ». L'événement $\bar{A}$ est :

a. « Obtenir un roi »

c. « Obtenir au moins une dame »

b. « N'obtenir aucun roi »

d. « Obtenir deux rois »

4. A et B sont deux événements issus d'une même expérience aléatoire.

Sachant que $p(B) = 0,3$; $p(A \cap B) = 0,1$ et $p(A \cup B) = 0,5$, on peut dire que la probabilité de l'événement A est :

a. 0,1

b. 0,2

c. 0,3

d. 0,4

5. On lance une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « Pile » est :

a. 0,25

b. 0,5

c. 0,75

d. 1

6. On lance 2 fois de suite une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir deux fois « Pile » est :

a. 0,25

b. 0,5

c. 0,75

d. 2

7. On lance 8 fois de suite une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir huit fois « Pile » est :

a. $\frac{1}{8}$

b. $\frac{1}{4}$

c. environ 0,001

d. environ 0,004

Exercice n° 43

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes.

On considère les événements suivants :

A : « Tirer un trèfle » et B : « Tirer un roi ».

1. Déterminer les probabilités des événements A et B .
2. Définir par une phrase l'événement $\bar{A}$ puis calculer sa probabilité.
3. Définir par une phrase les événements $A \cup B$ et $A \cap B$ puis calculer leur probabilité.

Exercice n° 44

* Une roue de loterie est formée de cinq secteurs. La loi de probabilité est donnée par le tableau suivant

Secteur	1	2	3	4	5
Probabilité	0,2	0,25	0,1	p_4	p_5

1. Déterminer p_4 et p_5 sachant que p_5 est le double de p_4 .
2. On lance cette roue puis on attend l'arrêt.
 - a. Quelle est la probabilité que la flèche indique un multiple de 2 ?
 - b. Quelle est la probabilité que la flèche indique un secteur avec un numéro inférieur ou égal à 3 ?

Exercice n° 45

Dans un lycée de 1 280 élèves, 300 élèves se font vacciner contre la grippe.

Pendant l'hiver, il y a une épidémie de grippe et 10% des élèves contractent la maladie.

De plus, 3% des élèves vaccinés ont la grippe.

Dans cet exercice, les résultats seront arrondis à 10^{-3} près.

1. Compléter le tableau

	Nombre d'élèves ayant eu la grippe	Nombre d'élèves n'ayant pas eu la grippe	Total
Nombre d'élèves vaccinés			
Nombre d'élèves non vaccinés			
Total			

2. On choisit au hasard un des élèves de ce lycée, tous les élèves ayant la même probabilité d'être choisi. Calculer la probabilité des événements suivants :

A : « L'élève a été vacciné » ;

B : « L'élève a eu la grippe » ;

C : « L'élève a été vacciné et a eu la grippe ».
3. On choisit au hasard un des élèves non vaccinés. Calculer la probabilité que cet élève ait eu la grippe.

Exercice n° 46

* * Une urne contient 5 boules indiscernables au toucher : deux bleues « B » et trois rouges « R ». On dispose également de deux sacs contenant des jetons : l'un est bleu et contient un jeton bleu « b » et trois jetons rouges « r » ; l'autre est rouge et contient deux jetons bleus « b » et deux jetons rouges « r ». On extrait une boule de l'urne puis on tire un jeton dans le sac qui est de la même couleur que la boule tirée.

1. Représenter cette expérience à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Déterminer la probabilité de l'événement A : « La boule et le jeton sont de la même couleur ».

Partie II : Progression partielle de la 1^{ère} enseignement de spécialité mathématiques :

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les premiers chapitres, les contenus mathématiques ainsi que les capacités attendues en 1^{ère} spécialité Mathématiques (pour prendre de l'avance sur le programme).

Chapitre 1	Contenus mathématiques	Capacités attendues
Equations, fonctions polynômes du second degré	<ul style="list-style-type: none"> • Définition d'un polynôme de degré 2 • Forme développée, forme factorisée et forme canonique • Discriminant d'un polynôme du second degré • Racines d'un polynôme du second degré • Expression de la somme et du produit des racines • Signe d'une fonction polynôme de degré 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Étudier le signe d'une fonction polynôme du second degré donnée sous forme factorisée. • Déterminer les racines d'une fonction polynôme du second degré à l'aide du discriminant. • Factoriser une fonction polynôme du second degré, en diversifiant les stratégies : racine évidente, détection des racines par leur somme et leur produit, identité remarquable, application des formules générales. • Choisir une forme adaptée (développée réduite, canonique, factorisée) d'une fonction polynôme du second degré dans le cadre de la résolution d'un problème (équation, inéquation, optimisation, variations)
Suites numériques	<ul style="list-style-type: none"> • Généralités sur les suites numériques • Suites arithmétiques • Suites géométriques 	<ul style="list-style-type: none"> • Calculer les termes d'une suite définie explicitement ou définie par récurrence • Sens de variation d'une suite • Représenter graphiquement une suite • Déterminer l'expression du terme général d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique • Montrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique • Calculer la somme des termes d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique

Chapitre 3	Contenus mathématiques	Capacités attendues
Trigonométrie	<ul style="list-style-type: none"> • Cercle trigonométrique. • Longueur d'arc. Radian. • Enroulement de la droite sur le cercle trigonométrique. • Image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique. • Cosinus et sinus d'un nombre réel. • Lien avec le sinus et le cosinus dans un triangle rectangle. • Valeurs remarquables. • Fonctions cosinus et sinus : Parité, périodicité. Courbes représentatives. 	<ul style="list-style-type: none"> • Savoir placer un point sur le cercle trigonométrique. • Lire le nombre réel associé à un point sur le cercle trigonométrique. • Connaître les angles remarquables ainsi que leurs cosinus et sinus • Lier la représentation graphique des fonctions cosinus et sinus et le cercle trigonométrique. • Traduire graphiquement la parité et la périodicité des fonctions trigonométriques. • Par lecture du cercle trigonométrique, déterminer les cosinus et sinus d'angles associés à x.
Chapitre 4	Contenus mathématiques	Capacités attendues
Calcul vectoriel et produit scalaire	<ul style="list-style-type: none"> • Définition du produit scalaire de deux vecteurs • Propriétés du produit scalaire • Bilinearité et symétrie • Caractérisation de l'orthogonalité • Produit scalaire dans un repère orthonormé • Formule d'Al-Kashi • Transformation de $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Calculer le produit scalaire à l'aide des normes et d'un angle. • Calculer le produit scalaire à l'aide de la projection orthogonale. • Calculer le produit scalaire à l'aide des coordonnées. • Calculer le produit scalaire à l'aide de normes. • Déterminer un angle entre 2 vecteurs connaissant le produit scalaire et les normes. • Démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux